

12. **Ixia** L. [nom. cons.]*

[Íxia, -ae f. – gr. *ixía*, -as f., *ixías*, -ou m. e *ixós*, -oû m.; lat. *ixia*, -ae f. = según Teofrasto (*ixía*), planta parásita del roble (*drýs*; *Quercus* sp. pl., caducifolios, *Fagaceae*), de la coscoja (*prînos*; *Q. coccifera* L.) –donde puede convivir con el muérdago (*hyphéar*; *Viscum album* L., *Viscaceae*)– y de otros árboles, la que hay quien supone sería el *Loranthus europaeus* Jacq. (*Loranthaceae*) y, además, una planta de Creta, Acaya, Media, etc., que exuda gomorresina y que llama también *tragákantha*, la que hay quien supone será una mata espinosa del género *Astragalus* L. (*Leguminosae*); Dioscórides llama *ixós*

* J.M. Cardiel

12. *Ixia*

a una liga hecha con los frutos de otra que sin duda es el muérdago; por otra parte, *ixias*, en el Pseudo Dioscórides, es nombre alternativo del *chamailéon leukós* ('camaleón blanco', véase más adelante); y, por fin, según Plinio *ixia* es nombre asimismo alternativo de un *chamaeleon* del que se distinguen dos formas, el *ch. candidus* ('camaleón blanco') y el *ch. niger* ('camaleón negro', en Dioscórides *chamailéon mélas*), los cuales producen o gomorresina o liga y hay quien ha supuesto podrán ser de modo respectivo el cardo de liga –*Carlina gummifera* (L.) Less. (*Atractylis gummifera* L., *Compositae*)– y el *Cardopatum corymbosum* (L.) Pers. (*Echinops corymbosus* L., *Compositae*). El género *Ixia* L. (*Iridaceae*) fue creado por Linneo (1738) ante algo que vino del cabo de Buena Esperanza, y validado en el mismo autor (1753, 1754), por más que su nombre inicial –que luego remanejó (1762)– hubo de ser conservado en 1962 con tipo diferente (*I. polystachya* L.); género, aclaremos, en el que hoy se integra una cincuentena de especies capenses que nada tienen que ver con las que arriba se mencionan –por más que, en su *Philosophia botanica* (1751), el insigne botánico sueco nos contase ocasionalmente que tomó su nombre genérico de Plinio ("Ixia") y Dioscórides ("ixías")]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras aéreas caducas. Bulbo sólido, de globoso a ovoide, con túnicas finamente fibrosas; raíces delgadas. Tallo erecto, delgado pero firme, a veces ramificado. Hojas bifaciales, coetáneas, planas, lineares o estrechamente ensiformes; las basales 2-6; las caulinares en menor número y más cortas. Inflorescencia espiciforme, dística o espiralada; brácteas numerosas, de oblongas a obovadas, truncadas, cortamente dentadas, de escariosas a membranáceas, subiguales, las exteriores cortamente bifidas. Flores actinomorfas, erectas, sésiles. Perianto con las piezas connatas, formando un tubo recto, exerto desde las brácteas, estrechamente cilíndrico, $\pm$ ensanchado en la boca; tépalos iguales, patentes, de oblongos a obovados. Estambres equilaterales; filamentos libres, rectos, más cortos que los tépalos, adnatos a la parte superior del tubo periantico; anteras basifijas. Ovario trilocular, con placentación axial; estilo recto, exerto, con 3 ramas cortas, lineares; estigmas terminales. Fruto en cápsula, de globosa a oblongoidea, con pericarpo delgado. Semillas numerosas, subglobosas o comprimidas, angulosas, $\pm$ lustrosas.

Observaciones.—Género con 50 especies, nativas de África austral. Numerosas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental. Se ha propuesto como número básico de cromosomas: $x = 10^*$.


Bibliografía.—G.J. LEWIS in J. S. African Bot. 28: 45-195 (1962).

1. *I. paniculata* D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. [paniculáta]
Nov.: 26, tab. 1 (1766)

Ind. loc.: "(...) in Horto Medico Hagae - Comitum decerpsi. Utraque habitat ad Cap. b. spei" [lectótipo designado por G.J. Lewis in J. S. African Bot. 28: 149 (1962); D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. Nov., tab. 1 (1766)]

lc.: Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 7(2): 67 fig. 21 (1999); D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. Nov., tab. 1 (1766); lám. 97

Hierba (20)30-100 cm. Bulbo de 12-20 mm de diámetro, subgloboso, con fibras de un color pardo claro, suaves, a veces membranáceas. Tallo normalmente con 1 o 2 ramas. Hojas 15-60 $\times$ 0,3-1,2 cm, de lineares a lanceoladas, de membranáceas a subcartáceas. Inflorescencia espiciforme, $\pm$ laxa, con (4)5-18 flores; brácteas (6)8-15 mm, pálidas, con la mitad inferior normalmente subhialina, la externa levemente emarginada, aguda o cortamente cuspidada, la interna aguda,



Lám. 97.—*Ixia paniculata*, Vila do Conde, Douro Litoral (COI 41549): a) hábito; b) brácteas; c) bráctea externa; d) bráctea interna; e) sección longitudinal del perianto, estambres y gineceo; f) detalle de las ramas estilares y estigmas.

bífida. Perianto de color crema, a veces amarillento; garganta a menudo rojiza o rosácea; tubo periántico (35)40-70 mm y de 3-5 mm de diámetro en la garganta, ligeramente expandido desde la base; tépalos 15-25 × 3-8 mm, más cortos que el tubo, oblongos o linear-oblongos, obtusos o emarginados. Filamentos (3)5-6 mm, incluidos en el tubo periántico, cortamente decurrentes; anteras 6-8 mm, generalmente purpúreas, incluidas en el tubo o completamente exertas. Estilo con ramas de 1,5-2 mm. Cápsula 3-4 × 3-4 mm. $2n = 20^*$.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de poblaciones; 0-20 m. IV-V. Originaria del W de Sudáfrica; naturalizada en gran parte del mundo. Dispersa por Galicia y el N de Portugal. **Esp.:** [C] [(Or)] [Po]. **Port.:** [BL] [DL]. **N.v., port.:** alfenim, jacinto, palmas, palmito, palmitos.

Observaciones.—No se han encontrado frutos maduros ni semillas en el material estudiado.