

22. *Anacamptis* Rich.*

[Anacámptis, -idis f. – gr. *anacámptō* = doblar, torcer, etc. Según se lee en el protólogo, porque el retináculo está lateralmente recurvado en forma subcilíndrica]

Plantas perennes, herbáceas, autótrofas. Tubérculos 2, de ovoides a subglobosos, indivisos. Tallos erectos, simples, cilíndricos, lisos, verdes, glabros. Hojas numerosas, caulinares y basales, lanceoladas, dispuestas helicoidalmente, atenuadas, de margen entero, sin venas transversales muy perceptibles, plegadas, verdes, sin manchas. Inflorescencia en espiga terminal, multiflora, densa, con el eje recto,

* C. Aedo

22. *Anacamptis*

cónica, erecta, con brácteas no envainadoras, membranáceas, coloreadas. Flores resupinadas, suberectas, sésiles. Sépalos laterales patentes, el central y los pétalos laterales conniventes en una gálea, subiguales, libres. Pétalos laterales semejantes a los sépalos; labelo ensanchado en la parte distal, con 3 lóbulos netos, subiguales, el central entero (a veces levemente emarginado), con 2 repliegues laminares en la base, sin crestas longitudinales; espolón largo, descendente, con néctar. Ginostemo corto; estigmas subredondeados, rostelo pequeño. Antera terminal, fija a la columna; polinios 2, retináculo 1, incurvado, bursícula simple; polen en tétradas. Fruto en cápsula erecta, oblonga. Semillas planas, reticuladas, con las mallas alargadas.

Bibliografía.—C. DEL PRETE, P. MAZZOLA & P. MICELI in *Pl. Syst. Evol.* 174: 115-123 (1991).

1. *A. pyramidalis* (L.) Rich., *De Orchid. Eur.*: 33 (1817) [pyramidális]

Orchis pyramidalis L., *Sp. Pl.*: 940 (1753) [basión.]


Aceras pyramidalis (L.) Rchb. fil. in Rchb., *Icon. Fl. Germ. Helv.* 13/14: 6 (1850)

Ind. loc.: “Habitat in Helvetiae, Belgii, Angliae, Galliae arenosis, cretaceis” [lectotipo designado por H. Baumann & al. in *Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid.* Baden-Württemberg 21: 439, 568-569 (1989); Ray, *Syn. Meth. Stirp. Brit.* ed. 3, tab. 18 (1724)]

lc.: Ross-Craig, *Draw. Brit. Pl.* 28, pl. 12 (1971); J. Stewart & Stearn, *Orchid Paintings* Bauer: 44-45 (1993); lám. 36; [fotografía 72](#)

Tubérculos 15-26 × 12-14 mm, enteros. Tallos 20-65(80) cm, delgados, sólidos, verdes, glabros, con escamas envainadoras, parduscas, en la base. Hojas 4-7(12), de 3,3-14(25) × 0,6-1,4(2,3) cm, agudas, atenuadas, envainadoras, glabras; las superiores progresivamente más cortas y, en las proximidades de la inflorescencia, bracteiformes. Inflorescencia 3,5-6,2(10) cm, con 15-40(60) flores, sésiles, cónica en la antesis y subcilíndrica después; bráctea de la flor basal 14 × 2,5 mm —más corta que la flor adyacente—, lanceolada, aguda, violácea, glabra. Sépalos 7-7,5 × 2-2,2 mm, lanceolados, agudos, algo carenados, glabros, de rosados a purpúreos. Pétalos laterales 6-6,5 × 2,5 mm, anchamente lanceolados, agudos, glabros, de rosados a purpúreos; labelo 7-10,5 mm, más largo que los sépalos, trilobado —con los lóbulos laterales de 4-4,5 mm, divergentes, obtusos, y el central de 4-4,5 mm, a veces levemente emarginado y acuminado—, con 2 repliegues laminares de c. 2,5 mm en la base, papiloso, de rosado a purpúreo —con la parte interna generalmente blanca—, con espolón de 14-17(20) × 0,8 mm, obtuso, algo curvado. Ginostemo corto, erecto, glabro. Antera c. 1,5 mm, ovoide, algo cuculada, obtusa; polinios verdes; caudículas amarillas. Ovario 15-16 × 1,6-1,7 mm, glabro. Fruto 12,7-16(17) × 3,6-4,3 mm, erecto, con 6 costillas. Semillas 0,35-0,4 × 0,1 mm. $2n = 36^*, 42^*, 54^*, 63^*, 72^*, 72+1B^*$; $n = 18^*, 21^*, 36$.

Matorrales, pastizales y claros de bosques; 0-1400(1700) m. (III)V-VII. Casi toda Europa —desde el S de Escandinavia hasta el S de Italia y Grecia, y desde Irlanda hasta el SW de Rusia—, W de Asia —Cáucaso, Anatolia, Siria, y Líbano— y N de África —de Marruecos a Túnez—. Casi toda la Península —aunque más frecuente en el N y E— e Islas Baleares. (**And.**) **Esp.**: A Ab Al B (Ba) Bi Bu Ca Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Ma Mu Na O Or P PM[Mil Mn Ib (Formentera) Cabrera] S Sg So SS T Te V Va Vi Z. **Port.**: Ag BA BAI BL E R. **N.v.**: orquídea piramidal; *port.*: satrião-menor; *cat.*: barretet (Menorca), flor caputxina.



Lám. 36.—*Anacamptis pyramidalis*, Oviedo, Asturias (MA 599574): a) hábito; b) bráctea; c) flor, vista frontal; d) flor, vista lateral; e) sépalo dorsal; f) sépalo lateral; g) pétalo; h) labelo; i) ginostemo, vista frontal; j) ginostemo, vista lateral; k) polinios; l) fruto; m) semilla.

Observaciones.—La intensidad del color de las flores varía notablemente, incluso en una misma población, de un rosa claro a púrpura oscuro. Determinadas plantas con los tallos más débiles y con flores blanquecinas y más pequeñas han sido llamadas *A. pyramidalis* var. *brachystachys* (d'Urv.) Boiss., Fl. Orient. 5: 57 (1884) [*Orchis brachystachys* d'Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 377 (1882), basión.]. Mucho más netamente diferenciada está la *A. urvilleana* Sommier & Caruana, Fl. Melit. Nova: 273 (1915), una especie endémica del archipiélago de Malta. Según C. del Prete, P. Mazzola & P. Miceli [cf. Pl. Syst. Evol. 174: 115-123 (1991)], se distingue de *A. pyramidalis* por su pequeña talla (de menos de 25 cm), sus espigas siempre cilíndricas y sus flores blancas o rosadas y pequeñas, a lo que se unen otros caracteres anatómicos y cromosómicos.

HÍBRIDOS

A. pyramidalis × *Gymnadenia conopsea*

× *Gymnanacamptis anacamptis* (F.H. Wilms) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 3: 855 (1907)

Gymnadenia × *anacamptis* F.H. Wilms in Verh. Naturhist. Vereines Preuss. Rheinl. Westphalens 25: 80 (1868)

A. pyramidalis × *Orchis coriophora*